

Kolín - CENTRÁLNÍ HŘBITOV - Inventarizace dřevin - stav k 13.3.2014

| STROMY | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--|---|
| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
| 1 | Fraxinus excelsior - jasan ztepilý | 58 | 12 | 15-20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | DSV, kolmý mladý obrost na vodorovných větvích, kořeny nadzvedávají dlažbu a obrubníky. | RZ |
| 2 | Pinus nigra - borovice černá | 23 | 5 | 10-15 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Nedostatek místa (staré akáty za zdí), DSV | BZ |
| 3-4 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 5 | Fraxinus excelsior - jasan ztepilý | 36 | 10-15 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 40-60 | Vysoko vyvětvěný, suché větve, snížená vitalita, vyosený z důvodu nedostatku místa. Roste poměrně vysoko nad terénem, kořeny po povrchu. | RZ |
| 6-9 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 10 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | vícekmén | 4 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20-40 | | BZ |
| 11 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | vícekmén | 3,5 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20-40 | | BZ |
| 12 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 30 | 4 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Výrazně vybarvený, kořeny po povrchu. | BZ |
| 13 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 25 | 3,5 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 14-15 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 16 | Picea omorica - smrk Pančičův | 31 | 5 | 10-15 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Mírně vyvětvěný z jedné strany. | BZ |
| 17 | Picea omorica - smrk Pančičův | 27 | 3,5 | 10-15 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Mírně vyvětvěný z jedné strany, 1m2 trojník. | BZ, <i>odstranit 1m2 náletu.</i> |
| 18 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 19 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | vícekmén | 2,5 | 10-15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 20 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | vícekmén | 2 | 10-15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 21 | <i>Thuja occidentalis kult. - zerav západní</i> | <i>vícekmén</i> | <i>1</i> | <i>0-5</i> | <i>0</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>20-40</i> | <i>Vyosená.</i> | <i>Kácet - probírka.</i> |
| 22 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 42 | 7 | 15-20 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 40-60 | Vyosený, velký pahýl, porostlý břečťanem, DSV | RZ |
| 23 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 38 | 6 | 15-20 | 2-3 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Jednostranná koruna, vyosený, porostlý břečťanem. Nedostatek místa - stromy na sousedním pozemku. | BZ |
| 24 | Picea omorica - smrk Pančičův | 28 | 3 | 15-20 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 20-40 | Jednostranná koruna, DSV. Nedostatek místa, stromy na sousedním pozemku. | BZ |
| 25-27 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 28 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 46 | 6 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40-60 | Vyřezané spodní větve, kořeny po povrchu, větve rostou do budovy. | RL-SP |
| 29 | Tsuga canadensis - jedlovec kanadský | 33 | 8 | 10-15 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 20-40 | Starý suchý vrchol, z boku vyrostl nový, vrůstá do budovy a do cesty. Celkově nevyrovnaná koruna. | RL-SP včetně celkové mírné obvodové redukce stromu tak, aby byl zachován charakteristický růst. |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--|--|
| 30 | Chamaecyparis lawsoniana kult. - cypřišek Lawsonův | 36 | 3 | 10-15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | DSV, vrůstá do budovy. | RL-SP |
| 31 | Populus alba Pyramidalis - topol bílý | 101 | 14 | 20-25 | 3 | 2 | 3 | 2-3 | 40-60 | Suché větve, spodní nevhodně úlené větve vedou nad střechou. Kolmý obrost odumírajících větví. Strom v těsné blízkosti budovy. | Kácet. |
| 32 | Acer campestre - javor babyka | 8 | 3 | 0-5 | 0-5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 33 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 26 | 2,5 | 15-20 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Vysoko vyvětvěný, v těsné blízkosti budovy. Ještě ponechat, ale strom bez perspektivy. | BZ |
| 34 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 37 | 4 | 15-20 | 4 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Poškozená kůra kmenu, v těsné blízkosti budovy. Ještě ponechat, ale strom bez perspektivy. | BZ |
| 35 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 36 | Populus alba Pyramidalis - topol bílý | 72 | 7 | 15-20 | 4 | 2 | 2 | 2-3 | 40-60 | Vysoko vyv., kmen p. břechťanem, drobné suché větve. | BZ |
| 37 | Pinus nigra - borovice černá | 38 | 5 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | DSV, dva vrcholy. | RZ |
| 38 | Pinus nigra - borovice černá | 42 | 7 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Zasahuje nad komunikaci, DSV. | RZ |
| 39-49 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 50 | Quercus robur - dub letní | 46 | 10 | 10-15 | 2,5 | 1 | 1 | 3 | 40-60 | Kmen porostlý břechťanem, DSV, vrůstá do mladé lípy. | RZ, RL-SP - odejmout celé spodní větve o průměru do 10cm. Vyšší zakrátit směrem k lípě řezem na boční větev. |
| 51 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 52 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 38 | 9 | 10-15 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 20-40 | Kmen porostlý břechťanem, DSV, vyosený, v koruně srovnáno. | RZ, RL-SP - odejmout celé spodní větve o průměru do 10cm. Vyšší zakrátit směrem k lípě řezem na boční větev. |
| 53-57 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 58 | Prunus serrulata Kanzan - třešeň pilovitá | 27 | 6 | 5-10 | 2,5 | 2-3 | 3 | 3 | 20-40 | Bez průběžného kmenu, kořeny po povrchu, vyosený - nedostatek prostoru. | BZ |
| 59 | Abies nordmanniana - jedle kavkazská | 27 | 6 | 10-15 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSP, zesponu vyřezaná | BZ |
| 60 | Catalpa bignonioides - katalpa trubačovitá | 35 | 5 | 10-15 | 2,5 | 2-3 | 3 | 2-3 | 20-40 | DSP, roste těsně vedle zdi, kořeny po povrchu, porostlá břechťanem, nedostatek místa. | Kácet - probírka. |
| 61 | Acer platanooides Drumondii - javor mléč | 18 | 4 | 5-10 | 3 | 3 | 2 | 2-3 | 20-40 | DSP, snižená vitalita, nedostatek místa. | Kácet - probírka. |
| 62-64 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 65 | Quercus robur Fastigiata - dub letní | 25 | 3 | 10-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Jednostranná koruna, DSV. | RZ |
| 66 | Castanea sativa - kaštanovník jedlý | 39 | 10 | 10-15 | 2,5 | 2-3 | 3 | 3 | 20-40 | Suché větve a pahýly, břechťan. | RZ |
| 67 | Castanea sativa - kaštanovník jedlý | 18, 27 | 8 | 10-15 | 2,5 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Vyosený směrem nad komunikaci, nedostatek prostoru, suché větve, kořeny po povrchu. | Kácet - probírka. |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--|-------------------|
| 68-69 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 70 | Castanea sativa - kaštanovník jedlý | 37 | 9 | 10-15 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 40-60 | Suché větve, břečťan, v těsné blízkosti zdi, kořeny po povrchu. Vrstvá do lampy VO za zdi a větve nízko nad parkovištěm. | RZ, RL-SP |
| 71 | Catalpa bignonioides - katalpa trubačovitá | 28 | 5 | 10-15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, kořeny po povrchu. | BZ |
| 72 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 73 | Catalpa bignonioides - katalpa trubačovitá | 27 | 4 | 10-15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, kořeny po povrchu. | BZ |
| 74 | Abies concolor - jedle stejnobarvá | 34 | 6 | 10-15 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 20-40 | Jednostranná koruna, vyosená, kořeny po povrchu. | BZ |
| 75 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 94 | 11 | 20-25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60-100 | Troják. | BZ |
| 76 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 29 | 5 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Dvoják s tlakovou lištou. | BZ |
| 77 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 29 | 6 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Čtverák, s tlakovými lištami. | BZ |
| 78 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 21 | 5 | 5-10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Troják s tlakovými lištami. | BZ |
| 79 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 11 | 2 | 5-10 | 1,8 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Zhojená prasklina dole na kmeni, troják. | BZ |
| 80 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 17 | 5 | 5-10 | 1,8 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Opakované dvojení s tlakovými lištami. | BZ |
| 81 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 65 | 15 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vysoko vyvětvěná, vysoko porostlá břečťanem | BZ |
| 82-84 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 3 | 5-10 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 85 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 64 | 12 | 20-25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Nesouměrná koruna, vysoko vyvětvěná, mohutné pahýly a drobné suché větve. | RZ |
| 86-87 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 8-10 | 2 | 5-10 | 1,8-2,1 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 88 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 72 | 12 | 15-20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Nepravidelná koruna. | BZ |
| 89 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 69 | 10 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Jedostranná koruna | BZ |
| 90 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 45 | 5 | 15-20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 60-100 | Málo vitální, malý objem koruny. Strom je vyosený, s vysoko položeným těžištěm. | Kácet - probírka. |
| 91 | Betula verrucosa - bříza bílá | 69 | 12 | 20-25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 60-100 | Vyosená. | BZ |
| 92 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 8-10 | 2 | 5-10 | 1,8-2,1 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 93 | Taxus baccata - tis červený | 45 | 7 | 5-10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Vrstvá do lísky a ostatních okolních dřevin. Průměr kmene měřen na pařezu. | Hluboké zmlazení. |
| 94 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 10 | 2 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | Mladý vitální strom. | RZ |
| 95 | Corylus column - líska turecká | 26 | 5 | 5-10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, méně vitální, v blízkosti vejmutovky. | BZ |
| 96 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 57 | 12 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Pahýly, DSV, vyosená, kořeny po povrchu. | RZ |
| 97-8 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 9 | 2 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | Mladý vitální strom. | RZ |
| 99 | Picea abies - smrk obecný | 53 | 8 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vysoko vyvětvěný, kořeny po povrchu. | BZ |
| 100 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 8 | 2 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 101 | Picea abies - smrk obecný | 53 | 10 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vysoko vyvětvěný | BZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|---|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|-------------------|
| 102 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 9 | 2 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 103-5 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 10 | 2 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 106 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 32 | 8 | 10-15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | Rozsáhlé místo kmene bez kůry. Troják s tlakovými lištami. | BZ |
| 107 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 27 | 7 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 108 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 21 | 6 | 5-10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Dvoják s tlakovou lištou. | BZ |
| 109 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 30 | 7 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Troják s lištami. | BZ |
| 110 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 12 | 5 | 5-10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Průběžný kmen. | BZ |
| 111A | Picea abies - smrk obecný | 51 | 9 | 20-25 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 111B | Picea abies - smrk obecný | 65 | 9 | 20-25 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 111C | Picea abies - smrk obecný | 59 | 7 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 112 | Picea abies - smrk obecný | 65 | 11 | 20-25 | 4 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 113 | Picea abies - smrk obecný | 52 | 9 | 20-25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 114 | Picea abies - smrk obecný | 88 | 11 | 20-25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 115 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 64 | 13 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Spodní větev s defektem, pahýly, drobné suché větve. | RZ |
| 116 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 53 | 10 | 20-25 | 11 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Nahoře vykloněná, SV. | RZ |
| 117 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 62 | 10-15 | 20-25 | 12 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem, pahýly. | BZ |
| 118 | Picea abies - smrk obecný | 58 | 9 | 20-25 | 7 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 119 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 42 | 6 | 15-20 | 10 | 2-3 | 2-3 | 2 | 60-100 | Vysoko vyvětvená, vyosená s vysoko postaveným těžištěm, SV. | Kácet - probírka. |
| 120 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 66 | 11 | 20-25 | 12 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 121 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 47 | 10 | 20-25 | 9 | 2-3 | 1 | 2 | 60-100 | Méně vitální | BZ |
| 122 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 55 | 10 | 20-25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 123 | Acer platanoides Drumondii - javor mléč | 6 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 124 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 67 | 12 | 20-25 | 12 | 2-3 | 2 | 3 | 60-100 | Vyosená s vysoko postaveným těžištěm, pahýly, DSV. | RZ |
| 125 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 68 | 12 | 20-25 | 8 | 2-3 | 2 | 3 | 60-100 | Vyosená s vysoko postaveným těžištěm, jednostranná koruna, pahýly, DSV. | RZ |
| 126-8 | Acer platanoides Drumondii - javor mléč | 6 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 129 | Betula verrucosa - bříza bílá | 52 | 10 | 20-25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 60-100 | Porostlá břechtanem, snižená vitalita, DSV. | BZ |
| 130 | Acer platanoides Drumondii - javor mléč | 6 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 131 | Picea abies - smrk obecný | 52 | 9 | 20-25 | 4 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvený, jednostranná koruna. | BZ |
| 132-3 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 134 | Picea abies - smrk obecný | 54 | 10 | 20-25 | 1,5 | 1 | 1 | 2-3 | 60-100 | Porostlý břechtanem. | BZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--|---|
| 135 | Picea abies - smrk obecný | 50 | 7 | 20-25 | 4 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechťanem, jednostranná koruna. | BZ |
| 136 | Picea abies - smrk obecný | 77 | 10 | 20-25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechťanem | BZ |
| 137 | Picea abies - smrk obecný | 62 | 6 | 20-25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60-100 | Vysoko porostlý břechťanem, jednostranná koruna. | BZ |
| 138 | Picea abies - smrk obecný | 46 | 8 | 20-25 | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko porostlý břechťanem, jednostranná koruna. | BZ |
| 139-141 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 142 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 86 | 12 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Troják | BZ |
| 143 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 64 | 8 | 15-20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 60-100 | Dvoják s lištou, v. vyvětvený, malý obj. koruny. Vyosený směrem nad chodník. | BZ, nepředpokládá se udržitelnost 10 let. |
| 144 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 59 | 8 | 15-20 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | | BZ |
| 145 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 68 | 9 | 15-20 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Jednostranná koruna. | BZ |
| 146-9 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 150 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 23 | 6 | 5-10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 151 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Dvoják | BZ |
| 152A,B | Aesculus x carnea - jirovec pleťový | 8 | 1,5 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 153 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 67 | 12 | 20-25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vysoko vyvětvená, výskyt suchých větví. | RZ |
| 154 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 3 | 5-10 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 155 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 70 | 13 | 20-25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Kořeny po povrchu, mírně vyosená. | BZ |
| 156 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 67 | 13 | 20-25 | 8 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Kmen výrazně porostlý břechťanem, suché větve a pahýly. | RZ |
| 157 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 79 | 15 | 20-25 | 6 | 2-3 | 3 | 3 | 60-100 | Mírně vyosená, suché větve a pahýly. Dvoják. | RZ |
| 158 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 3 | 5-10 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 159 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 3 | 5-10 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 160 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 161 | Picea pungens - smrk pichlavý | 13 | 3 | 0-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10-20 | Bez perspektivy, jednostranná koruna, uhýbá vedlejšímu stromu. | Kácet - probírka. |
| 162 | Betula verrucosa - břiza bílá | 42 | 6 | 15-20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40-60 | Mírně vyosená, suché větve, vrůstá do koruny sousedního stromu. | Kácet - probírka. |
| 163 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 164 | Pinus nigra - borovice černá | 42 | 8 | 15-20 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 20-40 | DSV, porostlá břechťanem. | RZ |
| 165-7 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 168 | Quercus robur - dub letní | 79 | 16 | 15-20 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | DSV - velké množství, pahýly. | RZ |
| 169 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 170 | Picea abies - smrk obecný | 68 | 10 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vyosený, pahýly, nepravidelná koruna. | BZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|---|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--|----------------|
| 171 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 85 | 14 | 20-25 | 5 | 3 | 3-4 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, výskyt plodnic dřevokazné houby, obráží po kmeni. DSV. | BZ |
| 172 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 3 | 5-10 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 173 | Picea abies - smrk obecný | 57 | 9 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Pokroucený kmen. | BZ |
| 174 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 175-6 | Acer platanoides Drumondii - javor mléč | 6 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 177 | Picea abies - smrk obecný | 30 | 9 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Větve nízko nad hroby a cestou. | RL-SP |
| 178 | Picea abies - smrk obecný | 57 | 8 | 20-25 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | | BZ |
| 179 | Picea abies - smrk obecný | 58 | 9 | 20-25 | 9 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Mírně vyosený, báze kmene nad terénem. | BZ |
| 180 | Picea abies - smrk obecný | 43 | 9 | 20-25 | 8 | 3 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvený, kmen porostlý břechťanem | BZ |
| 181 | Picea abies - smrk obecný | 43 | 8 | 20-25 | 8 | 3 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvený | BZ |
| 182 | Pinus ponderosa - borovice těžká | 30 | 5 | 10-15 | 2 | 1-2 | 2 | 3 | 20-40 | DSV | RZ |
| 183 | Acer negundo - javor jasanolistý | 25 | 7 | 5-10 | 2 | 1-2 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, kořeny po povrchu. | RZ |
| 184 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 38 | 6 | 20-25 | 13 | 3 | 2 | 2 | 60-100 | Vysoko vyvětvený, málo vitální, vyosený - možnost vyvrácení. | Kácet |
| 185 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 45 | 9 | 20-25 | 6 | 2-3 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvený, málo vitální, vyosený - možnost vyvrácení. | Kácet |
| 186 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 45 | 5 | 15-20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 60-100 | Jedostranná koruna, vyosená, kořeny zvedají chodník. | |
| 187 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 44 | 8 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Mírně vyosená. | |
| 188 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 56 | 9 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 189 | Picea abies - smrk obecný | 51 | 10 | 20-25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Kořeny zvedají náhrobky. | |
| 190 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 54 | 10 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Nepravidelná koruna. | BZ |
| 191 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 192 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 193 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 52 | 10 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vyosená. | BZ |
| 194 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 61 | 12 | 20-25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 195 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 48 | 8 | 20-25 | 7 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vyosená, DSV. | BZ |
| 196 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 50 | 10 | 20-25 | 7 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vyosená, pahýl. | BZ |
| 197 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 49 | 8 | 20-25 | 7 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vyosená, jednostranná koruna. Zvedá chodník. | BZ |
| 198 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 199 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 61 | 10 | 20-25 | 6 | 2 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Mírně vyosená, kořeny zvedají chodník a hrob. | BZ |
| 200 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 38 | 8 | 20-25 | 6 | 3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Výrazně vyosená. Pahýly, suché větve. | Kácet. |
| 201 | Picea abies - smrk obecný | 45 | 9 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvená, DSV | BZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 202 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 67 | 12 | 20-25 | 6 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Mírně vyosená, zvedá hrob a asfalt. DSV. | RZ |
| 203 | Picea abies - smrk obecný | 48 | 10 | 20-25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60-100 | Mírně vyosený, báze kmene nad terénem. | BZ |
| 204 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 205 | Picea abies - smrk obecný | 39 | 8 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40-60 | DSV, břečťan. | BZ |
| 206 | Picea abies - smrk obecný | 49 | 10 | 20-25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Břečťan. | BZ |
| 207 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | 37 | 5 | 10-15 | 2 | 2-3 | 2-3 | 3 | 40-60 | V blízkosti sousedního stromu. | Kácet - probírka. |
| 208 | Picea abies - smrk obecný | 46 | 8 | 15-20 | 5 | 2-3 | 2-3 | 2 | 40-60 | Kmen porostlý břečťanem až k vrcholu. DSV. | BZ |
| 209 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 67 | 10 | 20-25 | 7 | 2-3 | 2-3 | 2 | 60-100 | Jedostranná koruna, dvoják, méně vitální. Nevyvážený tvar koruny, suché větve, pahýly. | RZ |
| 210 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 211 | Picea abies - smrk obecný | 30 | 5 | 20-25 | 17 | 2 | 2 | 2 | 60-100 | Vysoko vyvětvěný, tenký dlouhý kmen. | Kácet - probírka. |
| 212 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 59 | 10 | 20-25 | 7 | 3 | 3 | 2-3 | 60-100 | Srostlý dvoják, nevyvážená koruna. Hojný výskyt suchých větví, kolmý obrost větví. | Kácet - probírka. |
| 213 | Acer platanoides - javor mléč | 62 | 10 | 20-25 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | DSV, kolmý obrost větví. | RZ |
| 214 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 43 | 8 | 20-25 | 17 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvěná, Zvedá hrob a chodník, vyosená. Vysoko postavené těžiště. | Kácet - probírka. |
| 215 | Acer platanoides - javor mléč | 49 | 10 | 20-25 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, DSV, pahýl. Řídká jednostranná koruna. | RZ |
| 216 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 43 | 7 | 20-25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 60-100 | Jednostranná koruna, DSV, malý objem koruny, vyosený. | RZ |
| 217 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 218 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 46 | 10 | 20-25 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Pahýly, DSV. | RZ |
| 219 | Picea abies - smrk obecný | 58 | 8 | 20-25 | 7 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvěný | BZ |
| 220 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 52 | 12 | 20-25 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, DSV, pahýl. | RZ |
| 221 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 55 | 10 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Bývalý dvoják, jeden z kmenů byl odříznut. DSV, pahýly, obrost kmene. | RZ, odstranit obrost kmene do výšky 3m. |
| 222 | Acer platanoides - javor mléč | 96 | 15 | 20-25 | 7 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Jednostranná koruna, DSV, pahýly, kolmý obrost větví. Vrstá do smrku. | RZ |
| 223 | Acer platanoides - javor mléč | 58 | 9 | 20-25 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, jednostranná koruna, DSV, pahýly | RZ |
| 224 | Acer platanoides - javor mléč | 78 | 12 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják, jednostranná koruna, DSV, pahýly | RZ, mírná RO |
| 225 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 27 | 6 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Vrstá do javoru, nedostatek místa. | Kácet - probírka. |
| 226 | Acer platanoides - javor mléč | 62 | 10 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | V těsné blízkosti vejmutovky. DSV, pahýly. | Odejmout spodní větev o průměru do 100mm, RL-SP - směrem k vejmutovce. RZ. |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 227 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 36 | 9 | 5-10 | 3 | 2 | 2-3 | 2 | 20-40 | Špatně zapěstovaná koruna, DSP, zahušťující drobné větve. | RZ, RL-SP - k pomníku. |
| 228 | Acer platanoides - javor mléč | 78 | 13 | 20-25 | 4 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják, jednostranná koruna, mírně vyosený, SV. | RZ, odstranit obrost kmene. |
| 229 | Acer platanoides - javor mléč | 66 | 13 | 20-25 | 6 | 2 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, jednostranná koruna, mírně vyosený, SV. | RZ |
| 230 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 48 | 9 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60-100 | Jednostranná koruna, dutinky v kmeni po starých řezech. Kořeny jdou po povrchu. | BZ |
| 231 | <i>Corylus colurna - líska turecká</i> | 28 | 6 | 10-15 | 3 | 2-3 | 2 | 2 | 20-40 | <i>Jednostranná koruna, vykloněná - uhýbá vejmutovce.</i> | <i>Kácet - probírka.</i> |
| 232 | Picea abies - smrk obecný | 77 | 12 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Mohutný strom, mírně vyosený, kořeny na cestě. | BZ |
| 233 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 72 | 13 | 20-25 | 5 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Pahýly, DSP. | RZ |
| 234 | Acer platanoides - javor mléč | 95 | 13 | 20-25 | 5 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Mohutný strom vyosený s nevyváženou korunou. | RZ, RO pro odlehčení a zlepšení stabilizace. |
| 235 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 8 | 3 | 0-5 | 1,8 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 236 | Tilia cordata - lípa malolistá | 43 | 10 | 15-20 | 4 | 2 | 2-3 | 3 | 40-60 | Dvoják s výraznou tlakovou lištou. | RZ |
| 237 | <i>Pinus strobus - borovice vejmutovka</i> | 39 | 8 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40-60 | <i>Výrazně vyosená směrem do koruny jirovce. Báze kmenu nad povrchem.</i> | <i>Kácet - probírka.</i> |
| 238 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 56 | 15 | 20-25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60-100 | Mohutný strom, hustě zavětvený, DSV. | RZ |
| 239 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 59 | 15 | 20-25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 60-100 | Mohutný strom, hustě zavětvený, DSV. | RZ |
| 240 | Thuja occidentalis - zerav západní | 18 | 3 | 5-10 | 1,5 | 3 | 2 | 2-3 | 20-40 | Vrůstá do mladého perspektivního stromu. | RL-SP |
| 241 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 12 | 2 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 242-6 | Acer platanoides kult. - javor mléč | 8 | 2 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 247 | Quercus robur - dub letní | 57 | 14 | 15-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40-60 | Pěkný strom s pravidelnou korunou. Kořeny vedou po povrchu a zvedají hrob. Báze kmenu nad terénem. DSP. | RZ |
| 248 | Picea abies - smrk obecný | 39 | 7 | 15-20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 40-60 | | BZ |
| 249 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 58 | 10 | 20-25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Kořeny vedou po povrchu cesty, DSV, větve klesají nízko. | |
| 250 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 58 | 8 | 15-20 | 5 | 2-3 | 2 | 3 | 60-100 | Dvoják, DSV, hojný výskyt drobných dutin po st. řezech. | BZ |
| 251 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 65 | 10 | 20-25 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Kmen vysoko porostlý břechtanem, dvoják, nepravidelná koruna. | BZ |
| 252-5 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 256 | Picea sp. - smrk | 47 | 10 | 20-25 | 3 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Kmen vysoko porostlý břechtanem | BZ |
| 257 | Picea abies - smrk obecný | 35 | 10 | 20-25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40-60 | Porostlý břechtanem, DSV. | BZ |
| 258 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|---|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 259 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 3 | 5-10 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 260 | Pinus ponderosa - borovice těžká | 24 | 5 | 5-10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSV | RZ |
| 261 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 51 | 12 | 20-25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Mohutný strom, nepatrně DSV. | BZ |
| 262 | Pinus ponderosa - borovice těžká | 22 | 4 | 0-5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 263 | Aesculus hippocastanum - jírovec maďal | 45 | 10 | 10-15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 40-60 | Drobné dutiny v kmeni po odřezaných větvích. | BZ |
| 264 | Aesculus hippocastanum - jírovec maďal | 35 | 10 | 10-15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40-60 | Dvoják. | BZ |
| 265 | Prunus sp. - slivoň | 30 | 6 | 0-5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 40-60 | | BZ |
| 266 | Tilia europaea - lípa evropská | 45 | 10 | 20-25 | 3 | 1-2 | 2 | 3 | 60-100 | DSV, dutina. Konkurenční drobné větve. | RZ |
| 267 | Tilia europaea - lípa evropská | 23 | 9 | 10-15 | 1,8 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | DSP | RZ |
| 268 | Aesculus x carnea - jírovec pletový | 8 | 1,5 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 269A,B | Aesculus x carnea - jírovec pletový | 8 | 1,5 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 270 | Tilia tomentosa - lípa stříbřitá | 46 | 9 | 20-25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 60-100 | Vyvětvený dvoják, se ztlustělým kmenem. SV a pahýly. Vrstá do sousední lípy. Nevyvážená koruna. | Kácet - probírka. |
| 271 | Tilia platiphylloides - lípa velkolistá | 84 | 15 | 20-25 | 6 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Mohutný strom, tlakové lišty, DSV. | RZ |
| 272 | Thuja occidentalis - zerav západní | | | | | | | | 10-20 | Přerostlý živý plot, vrstá do mladé lípy. | Nejbliž k lipě vyříznou celý kmínek o průměru do 100mm, zbylé dřeviny zakrátit na výšku cca 180cm. |
| 273 | Betula verrucosa - břiza bílá | 42 | 9 | 20-25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 40-60 | Vyosená, DSV. | Kácet probírka. |
| 274 | Betula verrucosa - břiza bílá | 44 | 9 | 20-25 | 4 | 3 | 2-3 | 2-3 | 40-60 | Vyosená, DSV. | BZ |
| 275 | Betula verrucosa - břiza bílá | 35 | 7 | 20-25 | 4 | 3 | 2-3 | 2 | 40-60 | Vyosená, DSV. | Kácet probírka. |
| 276 | Betula verrucosa - břiza bílá | 37 | 8 | 20-25 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 40-60 | DSV | BZ |
| 277 | Betula verrucosa - břiza bílá | 39 | 9 | 20-25 | 2 | 3 | 3 | 2-3 | 40-60 | Vyosená, dvoják | Kácet probírka. |
| 278 | Betula verrucosa - břiza bílá | 28 | 5 | 20-25 | 15 | 4 | 4 | 1-2 | 40-60 | DSV, vyosená | Kácet probírka. |
| 279 | Quercus rubra - dub červený | 50 | 12 | 20-25 | 3 | 1-2 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV, spodní větev vrstá do ml. jedle. | RZ, RL-SP |
| 280 | Quercus rubra - dub červený | 72 | 15 | 20-25 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják, suché větve. | RZ, RL-SP |
| 281 | Quercus rubra - dub červený | 42 | 9 | 20-25 | 5 | 1-2 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV. | RZ, RL-SP |
| 282 | Abies nordmanniana - jedle kavkazská | 13 | 4 | 0-5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Průměr měřen na pařezu | BZ |
| 283 | Picea pungens - smrk pichlavý | 10 | 3 | 0-5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10-20 | Průměr měřen na pařezu | BZ |
| 284 | Betula verrucosa - břiza bílá | 29 | 5 | 10-15 | 2,5 | 3 | 2-3 | 2 | 40-60 | Dvoják, vyosená, malé dutiny, DSV. | BZ |
| 285 | Betula verrucosa - břiza bílá | 37 | 6 | 20-25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40-60 | Dvoják, vyosená. DSV. | Kácet probírka. |
| 286 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 16 | 3 | 10-20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 287 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 15 | 3 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 288 | Quercus rubra - dub červený | 115 | 18 | 20-25 | 4 | 1 | 2-3 | 3 | 60-100 | Mohutný troják. Výskyt ochmetu, SV, kolmý obrost na některých větvích. | RZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 289 | Quercus rubra - dub červený | 96 | 15 | 20-25 | 4 | 1 | 2-3 | 3 | 60-100 | Mohutný troják. Výskyt ochmetu, SV, kolmý obrost na některých větvích. | RZ |
| 290 | Quercus rubra - dub červený | 49 | 10 | 20-25 | 4 | 2 | 2-3 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, vyosený z důvodu nedostatku místa. Malý objem koruny, výskyt SV, slabší z kmenů pod nevhodným úhlem vede nad komunikací. | Kácet probírka. |
| 291 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 60 | 12 | 15-20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | | |
| 292 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 68 | 14 | 15-20 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | | |
| 293 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 51 | 13 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 294 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 42 | 8 | 15-20 | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 60-100 | Výrazně vyosený, jedna větev vrůstá do zeravů u hrobu. | BZ, zakrátit zeravy o 2,5 a 3m. |
| 295 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 52 | 13 | 15-20 | 3 | 1-2 | 2 | 3 | 60-100 | DSV. Větev vrůstá do smrku. | RZ |
| 296 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 54 | 8 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 60-100 | Dvoják, výrazně vyosený. DSV. | RZ |
| 297 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 62 | 11 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Dvoják. | BZ |
| 298 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 60 | 12 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Jedna z větví vrůstá do zeravu. | Zakrátit zerav o 2m. |
| 299 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 44 | 10 | 15-20 | 5 | 1-2 | 1 | 3 | 60-100 | Vyosený. | BZ |
| 300 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 58 | 12 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Větev vrůstá do smrku. | |
| 301 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 52 | 12 | 15-20 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | Dvoják, DSV, jedna z větví vrůstá do zeravů. | |
| 302 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 5 | 10 | 15-20 | 2 | 1-2 | 2 | 3 | 60-100 | Dvoják, DSV, jedna z větví vrůstá do zeravů. | RZ |
| 303 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 62 | 12 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | | BZ. |
| 304 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 63 | 12 | 15-20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 305 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 50 | 11 | 15-20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 60-100 | | BZ |
| 306 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 307 | Platanus x acerifolia - platan javorolistý | 84 | 16 | 15-20 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 60-100 | Mohutný strom, jedna větev vrůstá do zeravů. | Zakrátit zeravy o 1,5 a 2m. |
| 308 | Tilia europaea - lípa evropská | 68 | 12 | 20-25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60-100 | Dvoják s výraznou tlakovou lištou. Obrost kmene, DSV. | RZ |
| 309-311 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 312 | Prunus sp. - třešeň | 38 | 5 | 5-10 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Dvoják. Břečťan. | BZ |
| 313 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 30 | 6 | 5-10 | 1 | 2-3 | 2 | 3 | 20-40 | Kmen porostlý břechťanem | BZ |
| 314 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 315 | Tilia europaea - lípa evropská | 12 | 4 | 5-10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10-20 | | |
| 316 | Tilia europaea - lípa evropská | 8 | 1 | 0-5 | 1,8 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 317 | Tilia europaea - lípa evropská | 10 | 2 | 0-5 | 1,8 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení. | RZ |
| 318 | Platanus x acerifolia kult. - platan javorolistý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 319 | Platanus x acerifolia kult. - platan javorolistý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 320 | Platanus x acerifolia kult. - platan javorolistý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|---|
| 321 | Platanus x acerifolia kult. - platan javorolistý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 322 | Platanus x acerifolia kult. - platan javorolistý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 323 | Platanus x acerifolia kult. - platan javorolistý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 324A-G | Fraxinus excelsior Globosa - jasan ztepilý | 8 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 325 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 41 | 8 | 10-15 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 40-60 | DSV, obrost kmene, | RZ |
| 326 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 58 | 12 | 15-20 | 2 | 1-2 | 2 | 3 | 60-100 | DSV, obrost kmene, | RZ |
| 327 | Acer platanoides - javor mléč | 67 | 13 | 15-20 | 2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 60-100 | Čtverák s tlakovými lištami. | BZ |
| 328 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 50 | 12 | 15-20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | DSV, obrost kmene, | RZ |
| 329 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 72 | 13 | 15-20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | DSV, pahýly, obrost kmene, | RZ |
| 330 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 32 | 6 | 10-15 | 3 | 2-3 | 2 | 3 | 40-60 | Dvoják, nesouměrná koruna, DSV | RZ |
| 331 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 42 | 8 | 15-20 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Nesouměrná koruna, DSV, pahýly. | RZ |
| 332 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 44 | 8 | 15-20 | 2,5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Nesouměrná koruna, DSV, pahýly. | RZ |
| 333 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 58 | 10 | 15-20 | 4 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Břečťan, SV, pahýly | RZ |
| 334 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 58 | 13 | 15-20 | 2 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Obrost větví a kmene, SV. | RZ, RL-SP hroby. |
| 335 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum - javor klen | 45 | 6 | 15-20 | 4 | 3 | 2-3 | 3 | 40-60 | Nesouměrná koruna, pahýly, SV | RZ |
| 336-7 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 338 | Fraxinus excelsior Globosa - jasan ztepilý | 30 | 5 | 0-5 | 1,5 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | DSV, konkurenční větve. | RZ |
| 339 | Betula verrucosa - bříza bílá | 28 | 5 | 10-15 | 1,5 | 2-3 | 2 | 3 | 20-40 | DSV | BZ |
| 340 | Fraxinus excelsior Globosa - jasan ztepilý | 21 | 4 | 0-5 | 1,8 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | DSV, trouchnivé dřevo ve starých řezech. | RZ |
| 341 | Fraxinus excelsior Globosa - jasan ztepilý | 24 | 2,5 | 0-5 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Trouchnivé dřevo v úžlabí věvení. | BZ, není udržitelnost 10 let. |
| 342 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 13 | 3,5 | 0-5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 343 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 20 | 3,5 | 0-5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 10-20 | Suché spodní větve. | RZ |
| 344 | Picea abies - smrk obecný | 10 | 2 | 0-5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 0-10 | Průměr měřen na pařezu. Troják, nevzhledný, nevhodné místo. | Kácet - uvolnění místa pro vhodnější výsadbu. |
| 345 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 21 | 4 | 5-10 | 1,3 | 1 | 1 | 3 | 0-10 | Nevhodné místo. | Kácet - uvolnění místa pro vhodnější výsadbu. |
| 346 | Pinus strobus - borovice vejmutovka | 10 | 1 | 0-5 | 1,3 | 3 | 2 | 3 | 0-10 | Nevhodné místo. | Kácet - uvolnění místa pro vhodnější výsadbu. |
| 347 | Betula verrucosa - bříza bílá | 34 | 6 | 10-15 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 20-40 | DSV | BZ |
| 348 | Betula verrucosa - bříza bílá | 40 | 7 | 15-20 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 20-40 | DSV | BZ |
| 349-450 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 351 | Corylus column - líska turecká | 30 | 9 | 10-15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 20-40 | Mírně vyosená, jednostranná koruna. | BZ |
| 352 | Betula verrucosa - bříza bílá | 28 | 6 | 15-20 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 20-40 | Malý objem koruny, DSV. | BZ |
| 353 | Betula verrucosa - bříza bílá | 43 | 9 | 20-25 | 3 | 2-3 | 2 | 3 | 20-40 | DSV. Větev vrůstá do smrku. | BZ |
| 354 | Betula verrucosa - bříza bílá | 31 | 7 | 15-20 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 20-40 | Dvoják, výrazně vyosená, DSV | BZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|-----------------|
| 355 | Betula verrucosa - bříza bílá | 27 | 6 | 15-20 | 10 | 3 | 2 | 2-3 | 20-40 | Malý objem koruny, DSV. | BZ |
| 356 | Betula verrucosa - bříza bílá | 36 | 6 | 20-25 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 20-40 | DSV | BZ |
| 357 | Betula verrucosa - bříza bílá | 32 | 5 | 20-25 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 20-40 | Vykloněná, DSV | BZ |
| 358 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 10 | 3,5 | 0-5 | 0 | 1-2 | 1 | 3 | 10-20 | Roubovanec | BZ |
| 359 | Aesculus hippocastanum - jirovec maďal | 30 | 7 | 15-20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Úprava podchozí výšky - součást běžné údržby - mimo rozpočet tohoto projektu. | BZ |
| 360 | Betula verrucosa - bříza bílá | 32 | 7 | 20-25 | 4 | 2-3 | 2 | 2-3 | 20-40 | DSP | BZ |
| 361 | Betula verrucosa - bříza bílá | 30 | 5 | 20-25 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 20-40 | DSP | BZ |
| 362 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 363 | Corylus colurna - líska turecká | 15 | 3 | 5-10 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 10-20 | Blízko zdi, obrost kmene. | BZ |
| 364 | Corylus colurna - líska turecká | 16 | 3 | 5-10 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 10-20 | Blízko zdi, obrost kmene. | BZ |
| 365 | Corylus colurna - líska turecká | 17 | 3 | 5-10 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 10-20 | Blízko zdi, obrost kmene. | BZ |
| 366 | Corylus colurna - líska turecká | 15 | 3 | 5-10 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 10-20 | Blízko zdi, obrost kmene. | BZ |
| 367 | Quercus rubra - dub červený | 20 | 4 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | U zdi, DSV, kořeny po povrchu. | BZ |
| 368 | Quercus rubra - dub červený | 28 | 6 | 15-20 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 20-40 | U zdi, DSV, kořeny po povrchu. | BZ |
| 369 | Quercus rubra - dub červený | 33, 40 | 8+8 | 15-20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | Prům. km. 24, 30cm, vrůstá do zdi | BZ |
| 370 | Corylus colurna - líska turecká | 27 | 6 | 15-20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, jednostranná koruna. | BZ |
| 371 | Quercus robur - dub letní | 43 | 9 | 15-20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20-40 | SV, pahýly. | RZ |
| 372 | Acer platanoides - javor mléč | 62 | 12 | 15-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60-100 | Mohutný dvoják, DSV | RZ |
| 373 | Acer platanoides - javor mléč | 60 | 12 | 15-20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 60-100 | Dvoják, DSV, defektní větev s kolmým obrostem. | RZ |
| 374 | Acer platanoides - javor mléč | 35 | 6 | 10-15 | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 20-40 | Jednostranná koruna, vyosený - uhýbá dubu, DSV. | RZ |
| 375 | Acer platanoides - javor mléč | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 356 | Acer platanoides - javor mléč | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 377 | Abies sp. - jedle | 13 | 3 | 0-5 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 10-20 | Nedostatek místa, suchý vrchol, bez perspektivy na stanovišti. | Kácet probírka. |
| 378 | Betula verrucosa - bříza bílá | 40 | 6 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 40-60 | DSV, jednostranná koruna. | BZ |
| 379 | Koelreuteria paniculata - svitel latnatý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 380 | Koelreuteria paniculata - svitel latnatý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 381 | Quercus rubra - dub červený | 66 | 13 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 60-100 | Vyosený, DSV | BZ |
| 382 | Quercus rubra - dub červený | 78 | 15 | 20-25 | 6 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV, pahýly. | RZ |
| 383 | Quercus rubra - dub červený | 45 | 8 | 20-25 | 15 | 2 | 2-3 | 3 | 40-60 | SV, pahýly. | RZ |
| 384 | Quercus rubra - dub červený | 70 | 10 | 20-25 | 3 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják, SV, pahýly. | RZ |
| 385 | Quercus rubra - dub červený | 30 | 8 | 20-25 | 3 | 2-3 | 2 | 3 | 40-60 | Vyosený, obrost kmene. | RZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|---|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 386 | Quercus rubra - dub červený | 33 | 9 | 20-25 | 3,5 | 2-3 | 2 | 3 | 40-60 | Obrost kmene. | RZ |
| 387 | Quercus rubra - dub červený | 46 | 13 | 20-25 | 4 | 2 | 2-3 | 3 | 40-60 | SV | |
| 388 | Quercus rubra - dub červený | 85 | 13 | 20-25 | 5 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Silná větev s defektem, SV, ochmet. | RZ, RL-LR - redukce ve směru vyklonění, pro odlehčení a vyrovnaní. |
| 389A | Koelreuteria paniculata - svitel latnatý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 389B | Koelreuteria paniculata - svitel latnatý | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 390 | Quercus rubra - dub červený | 72 | 13 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Velké množství ochmetu, DSV | RZ |
| 391 | Quercus rubra - dub červený | 56 | 10 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják, SV | RZ |
| 392 | Quercus rubra - dub červený | 34 | 5 | 20-25 | 10 | 3 | 3 | 2-3 | 60-100 | Vysoko vyvětvený, malý objem koruny. | BZ - nemá udržitelnost 10 let. |
| 393 | Quercus rubra - dub červený | 60 | 12 | 20-25 | 7 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják, SV. | RZ |
| 394 | Quercus rubra - dub červený | 64 | 12 | 20-25 | 10 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | Ochmet, SV | RZ |
| 395 | Quercus rubra - dub červený | 84 | 12 | 20-25 | 8 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV | RZ |
| 396 | Quercus rubra - dub červený | 78 | 16 | 20-25 | 7 | 2 | 3 | 3 | 60-100 | Vyosený, jednostranná koruna. SV. | RL-LR - redukce ve směru vyklonění, pro stabilizaci dřeviny. |
| 397 | Abies nordmanniana - jedle kavkazská | 14 | 3,5 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 398 | Abies nordmanniana - jedle kavkazská | 12 | 3,5 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 399-411 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 1-2,5 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 412 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 2 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | 1m2 nálet Fraxinus | BZ, odstranit 1m2 náletu. |
| 413-15 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 2 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 416-25 | Tilia cordata Rancho - lípa malolistá | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení | RZ |
| 426 | Quercus robur Fastigiata - dub letní | 150 | 9 | 20-25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 60-100 | Průměr na pařezu. DSV, větve s defekty. | RZ |
| 427-31 | Tilia cordata Rancho - lípa malolistá | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení | RZ |
| 432A-C | Tilia cordata Rancho - lípa malolistá | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení | RZ |
| 433 | Tilia platiphyllo - lípa velkolistá | 32 | 9 | 10-15 | 2,2 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, pahýly. | RZ |
| 434A-C | Tilia cordata Rancho - lípa malolistá | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení | RZ |
| 435A-C | Tilia cordata Rancho - lípa malolistá | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení | RZ |
| 436 | Tilia platiphyllo - lípa velkolistá | 40 | 10 | 10-15 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | Dvoják, DSV, pahýly. | RZ |
| 437A-CH | Tilia cordata Rancho - lípa malolistá | 8 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV, kodominantní větvení | RZ |
| 438 | Tilia tomentosa - lípa stříbrná | 38 | 10 | 10-15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Větev s defektem, DSV. | RZ |
| 439A-N | Robinia ps. Umbraculifera - trnovník akát | 7 | 2 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 440 | Quercus rubra - dub červený | 88 | 15 | 20-25 | 5 | 2 | 2-3 | 3 | 60-100 | Dvoják. Velké množství ochmetu, SV. | RL-LR - redukce ve směru vyklonění, pro stabilizaci dřeviny. |
| 441 | Quercus rubra - dub červený | 26 | 8 | 15-20 | 5 | 2 | 2-3 | 3 | 40-60 | Suché větve, nepravidelná koruna. | RZ |
| 442 | Pozice neobsazena | | | | | | | | | | |
| 443 | Picea pungens - smrk pichlavý | 12 | 4 | 0-5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10-20 | Jednostranný, málo místa, bez perspektivy | BZ |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 444 | Abies normanniana - jedle kavkazská | 14 | 5 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Mírně jednostranná | BZ |
| 445 | Quercus rubra - dub červený | 83 | 14 | 20-25 | 5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV, obrost kmene. | RZ |
| 446 | Quercus rubra - dub červený | 55 | 6 | 15-20 | 6 | 2-3 | 2-3 | 3 | 40-60 | SV, větev s defektem, obrost kmene. | RZ |
| 447 | Quercus rubra - dub červený | 62 | 8 | 20-25 | 4 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV, obrost kmene. | RZ |
| 448 | Quercus rubra - dub červený | 90 | 15 | 20-25 | 4 | 2-3 | 2-3 | 3 | 60-100 | SV, těžká hlavní větev vede nad chodníkem. | RZ, RL-LR - odlehčit větev, která vede nad chodník, pro stabilizaci. |
| 449 | Prunus cerasifera - myrobalán | 7,8,8 | 4 | 5-10 | 1 | 2 | 2 | 2-3 | 10-20 | Vyosený, málo místa, bez perspektivy. | Kácet - probírka. |
| 450 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 10 | 2 | 0-5 | 0 | 2-3 | 2-3 | 2 | 10-20 | Jednostranná koruna, nedostatek místa. | Kácet - probírka. |
| 451 | Quercus robur - dub letní | 54 | 10 | 15-20 | 3,5 | 1 | 2-3 | 3 | 40-60 | DSV | RZ |
| 452 | Acer platanoides - javor mléč | 40 | 10 | 15-20 | 3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 40-60 | Výrazně vyosený, DSV. | RZ, RL-LR - redukce větvi ve směru vyklonění pro stabilizaci dř. |
| 453 | Acer pseudoplatanus - javor klen | 50 | 8 | 20-25 | 6 | 2 | 2-3 | 2-3 | 40-60 | Vyosený, DSV. | RZ |
| 454 | Acer platanoides - javor mléč | 42 | 8 | 20-25 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 40-60 | Vyosený, DSV - nepatrně. | BZ |
| 455 | Acer platanoides - javor mléč | 48 | 10 | 20-25 | 6 | 3 | 2 | 2-3 | 40-60 | Prořídilý, málo vitální, břečťan. | BZ |
| 456 | Tilia tomentosa - lípa stříbrná | 42 | 5 | 5-10 | 2 | 3 | 2-3 | 3 | 20-40 | DSV, křížící se větve. | RZ |
| 457 | Abies concolor - jedle stejnobarvá | 19 | 3 | 5-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | | BZ |
| 458 | Pseudotsuga menziesii - douglaska Menziesova | 26 | 5 | 10-15 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 20-40 | Vyosená. Úprava podchozí výšky - průběžně v rámci běžné údržby. | BZ |
| 459 | Pseudotsuga menziesii - douglaska Menziesova | 37 | 6 | 10-15 | 2,5 | 1 | 1-2 | 3 | 20-40 | Vyosená, DSV. | BZ |
| 460-2 | Acer pseudoplatanus Rotterdam - javor klen | 8 | 2 | 0-5 | 2,2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 463 | Pinus silvestris - borovice lesní | 54 | 10 | 10-15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Zajímavý bizarní růst. | BZ |
| 464 | Tilia cordata - lípa malolistá | 32 | 10 | 10-15 | 2,2 | 1 | 1-2 | 3-4 | 20-40 | Pěkná, břečťan, DSV. | BZ |
| 465 | Picea omorica - smrk Pančičův | 24 | 4 | 10-15 | 1 | 1 | 1-2 | 3 | 20-40 | Vyvětvená. | BZ |
| 466-7 | Acer pseudoplatanus Rotterdam - javor klen | 8 | 2 | 0-5 | 2,2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 468A,B | Acer pseudoplatanus Rotterdam - javor klen | 8 | 2 | 0-5 | 2,2 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV. | RZ |
| 469 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 50 | 8 | 15-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 470 | Pinus nigra - borovice černá | 40 | 6 | 10-15 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSV, břečťan. | RZ, odstranit břečťan z kmene. |
| 471 | Picea omorica - smrk Pančičův | 34 | 3 | 5-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Vyvětvený, kmen porostlý břečťanem. | BZ |
| 472 | Picea pungens Argentea - smrk pichlavý | 42 | 5 | 10-15 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 20-40 | DSV. | RZ |
| 473 | Acer platanoides - javor mléč | 54 | 10 | 10-15 | 3,5 | 1-2 | 2 | 3 | 40-60 | Dvoják, DSV. | RZ |
| 474 | Pinus nigra - borovice černá | 34 | 5 | 10-15 | 2 | 3 | 3 | 2-3 | 20-40 | Jednostranná koruna, výrazně vyosená. | Kácet. |
| 475 | Picea omorica - smrk Pančičův | 28 | 6 | 10-15 | 2 | 1-2 | 2 | 2-3 | 20-40 | DSV, úprava podchozí výšky v rámci běžné údržby. | BZ |
| 476 | Thuja occidentalis - zerav západní | 14 | 2 | 5-10 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2 | 20-40 | Nedostatek místa, tis je perspektivnější. | Kácet - probírka. |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|-------------|--|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 477 | Abies nordmanniana - jedle kavkazská | 45 | 6 | 10-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 478A-G | Carpinus betulus - habr obecný | 10 | 3 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | DSV | RZ |
| 479 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 2 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | Násl. tuje různého vzhledu, působí nejednotně. | BZ |
| 480-1 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 4 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | Přiměřeně zúžit korunu. |
| 482-4 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 2 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 485 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 4 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | Přiměřeně zúžit korunu. |
| 486-90 | Thuja occidentalis kult. - zerav západní | | 3 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20-40 | | BZ |
| 491-561 | Tilia cordata kult. - lípa malolistá | 10-16 | 3 | 5-10 | 1,9-2,3 | 1 | 1 | 3 | 10-20 | Drobné suché větve, kodominantní větvení, křížící se větve. | ZR |
| KEŘE | | | | | | | | | | | |
| k1 | Rhododendron hybr. - pěnišník velkokvětý | | 2 | 1,7 | | | | | | | BZ |
| k2A | TŽP - Taxus baccata - tis červený | | 1,8 | 1 | | | | | | | BZ |
| k2B | TŽP - Taxus baccata Hicksii - tis červený | | 0,6 | 1,3 | | | | | | | BZ |
| k3 | Viburnum lantana - kalina tušalaj | | 5 | 3,5 | | | | | | Pěkný keř. | BZ |
| k4 | Ruderální porost - Acer pseud. - javor klen, Acer neg. - javor jas., Robinia ps. - trnovník b., Sambucus nigra - bez černý, v. nad 1m - 8m2 | | | | | | | | | | |
| k5 | Taxus baccata kult. - tis červený | | 6 | 3,5 | | | | | | Prorůstá 2m2 náletu jasanu, střet s budovou. | Odstranit 2m2 náletu, celková redukce keře zakrácením větví cca o 1/3 délky. |
| k6 | Cotoneaster sp. - skalník /opadavý/ | | 5 | 3 | | | | | | | BZ |
| k7 | Taxus baccata kult. - tis červený | | 5 | 8 | | | | | | | BZ |
| k8 | Acer platanoides - javor mléč | | 2 | 6 | | | | | | Nálet javoru prorůstající tisem. | Odstranit 2m2 náletu. |
| k9 | Viburnum rhytidophyllum - kalina vrásčitolistá | | 3 | 3,5 | | | | | | | BZ |
| k10 | Viburnum rhytidophyllum - kalina vrásčitolistá | | 3 | 3,5 | | | | | | | BZ |
| k11 | Forsythia suspensa - zlatice převislá | | 5 | 3 | | | | | | Keř v blízkosti budovy. | Zmlazení průklestem. |
| k12 | Juniperus chinensis Pfitzeriana - jalovec čínský | | 5 | 4 | | | | | | Nakloněný nad dlažbu, překáží při vstupu do kanceláří. Starý keř, nelze redukovat. | Kácet. |
| k13 | Skupina: Juniperus chinensis kult. - jalovec čínský | | | 2,5-3,5 | | | | | | Drobné suché větve | BZ |
| k14 | Thujopsis dolobrata - zeravinec japonský | | 3 | 1,5 | | | | | | Vrůstá do chodníku, nevzhledný, nálet škumpy. | Kácet, odstranit 2m2 náletu. |
| k15 | Viburnum lantana - kalina tušalaj | | 4 | 4 | | | | | | | BZ |
| k16 | Taxus cuspidata - tis japonský | | 4 | 2 | | | | | | Roste v blízkosti komunikace. | Celková redukce keře zakrácením výhonů cca o 1/4 delky a více. |
| k17 | Viburnum lantana - kalina tušalaj, semenáč tisů | | 1+0,5 | 2 | | | | | | Náletové keře v těsné blízkosti zdi. | Odstranit 2m2 náletu. |
| k18 | Taxus cuspidata - tis japonský | | 4 | 2,5 | | | | | | Prorůstá Fraxinus ex. do 1m v., 1m2 | Odstranit 2m2 náletu. Úplné zmlazení tisů. |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|---|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| k19 | <i>Taxus cuspidata</i> - tis japonský | | 4 | 2,5 | | | | | | Prorůstá Fraxinus ex. do 1m v., 1m2 | Odstranit 2m2 náletu. Úplné zmlazení tisů. |
| k20 | <i>Viburnum lantana</i> - kalina tušalaj, <i>Taxus baccata</i> | | 2+1 | 2,5 | | | | | | Náletové nevzhledné keře v blízkosti zdi. | Odstranit 3m2 náletu. |
| k21 | <i>Philadelphus sp.</i> - pustoryl, <i>Forsythia</i> | | | 3 | | | | | | Náletové nevzhledné keře v blízkosti zdi 8m2. | Odstranit 8m2 náletu. |
| k22 | <i>Syringa vulgaris</i> - šeřík obecný, <i>Forsythia int.</i> - zlatice | | 2x0,5 | 1,5 | | | | | | Náletové keře v těsné blízkosti pomníku. | Kácet - vhodnější výsadba. |
| k23 | <i>Syringa vulgaris</i> - šeřík obecný | | 1,2 | 1,5 | | | | | | Náletové keře v těsné blízkosti pomníku. | Kácet - vhodnější výsadba. |
| k24 | <i>Taxus baccata</i> kult. - tis červený | | 6 | 3 | | | | | | Pěkný keř. | BZ |
| k25 | <i>Taxus baccata</i> kult. - tis červený | | 4,5 | 3,5 | | | | | | Pěkný keř. | BZ |
| k26 | TŽP - <i>Taxus baccata</i> - tis červený | | 2 | 1,2 | | | | | | Velmi pěkný | BZ |
| k27-29 | <i>Thuja occidentalis</i> Globosa - zerav západní | | 1,2 | 1,2 | | | | | | | BZ |
| k30 | TŽP - <i>Thuja occidentalis</i> - zerav západní | | 0,6 | 1,2 | | | | | | | BZ |
| k31-33 | <i>Juniperus communis</i> Hibernica - jalovec obecný | | 0,4 | 0,8 | | | | | | | BZ |
| k34 | VRŽP - <i>Lonicera tatarica</i> - zimolez tatarský | | 2,5 | 3 | | | | | | Jednorázově v minulosti zmlazeno, mezerovitý, nevzhledný. 39m2. | Kácet (nahradit vhodnější výsadbou). |
| k35 | VRŽP - <i>Thuja occidentalis</i> - zerav západní | | 2,5 | 4 | | | | | | Přerostlé nevzhledné holé kmeny zeravů, nedá se předpokládat žádné zapěstování tvarované stěny, 34m2. | Kácet (nahradit vhodnější výsadbou). |
| k36 | TŽP - <i>Buxus sempervierens</i> - zimostráz vždyz. | | 0,4 | 0,4 | | | | | | | BZ |
| k38 | <i>Taxus baccata</i> kult. - tis červený | | 4 | 5 | | | | | | Přerostlý keř, který se do daného prostoru nemůže vejít. | Hluboké celkové zmlazení. |
| k39 | <i>Taxus baccata</i> kult. - tis červený | | 3 | 3,5 | | | | | | Přerostlý keř, který se do daného prostoru nemůže vejít. | Hluboké celkové zmlazení. |
| k40 | <i>Taxus baccata</i> kult. - tis červený | | 3,5 | 5 | | | | | | Přerostlý keř, který se do daného prostoru nemůže vejít. | Hluboké celkové zmlazení. |
| k41 | <i>Taxus baccata</i> kult. - tis červený | | 4 | 3,5 | | | | | | Přerostlý keř, který se do daného prostoru nemůže vejít. | Hluboké celkové zmlazení. |
| k42 | <i>Taxus baccata</i> - tis červený | | 3 | 4 | | | | | | Přerostlý keř, který se do daného prostoru nemůže vejít. | Hluboké celkové zmlazení. |
| k43 | <i>Thuja occidentalis</i> kult. - zerav západní | 14 | 2 | 5 | | | | | | Nevzhledná dřevina - nedostatek místa. | Kácet - probírka. |
| k44 | TŽP - <i>Taxus baccata</i> - tis červený | | 0,6 | 0,7 | | | | | | Ze sousedního pozemku prorůstají náletové dř. | BZ, odstranit 10m2 náletu . |

| poř. č. | název | průměr km. /cm/ | průměr koruny /m/ | výška /m/ | výška nasaz. koruny /m/ | vitalita | zdravot. stav | sad. hodnota | věková kategorie | poznámka | navržený zásah |
|---------|-------|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------|
|---------|-------|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------|

LEGENDA:

| SADOVNICKÁ HODNOTA | |
|--------------------|---|
| 5 | dřeviny zdravé a nepoškozené |
| 4 | zdravé dřeviny typického tvaru jen nepatrně narušené |
| 3 | dřeviny zdravé s předpokladem, že se dlouho udrží |
| 2 | dřeviny značně poškozené, staré, bez jakýchkoliv předpokladů dalšího vývoje |
| 1 | dřeviny silně poškozené, nemocné, napadené, odumírající a odumřelé |

| VITALITA | |
|----------|-------------------|
| 0 | vysoká |
| 1 | mírně narušená |
| 2 | zřetelně narušená |
| 3 | výrazně snižená |
| 4 | zbytková vitalita |
| 5 | odumřelý strom |

| ZDRAVOTNÍ STAV | |
|----------------|------------------|
| 0 | výborný |
| 1 | dobrý |
| 2 | zhoršený |
| 3 | výrazně zhoršený |
| 4 | silně narušený |
| 5 | havarijní |

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ - ŘEZY STROMŮ DLE ARBORISTICKÉHO STANDARDU ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012

ŘEZY UDRŽOVACÍ

| | |
|-------|--------------------------------------|
| RZ | Řez zdravotní |
| RL | Skupina redukčních řezů lokálních |
| RL-SP | Lokální redukce směrem k překážce |
| RL-LR | Lokální redukce z důvodu stabilizace |

ŘEZY STABILIZAČNÍ

| | |
|----|------------------|
| RO | Redukce obvodová |
|----|------------------|

DALŠÍ POUŽITÉ ZKRATKY

| | |
|-----|--------------------|
| BZ | bez zásahu |
| DSV | drobné suché větve |